

Commune de Saint Sornin 16220

Fiche conseil Piéride du Chou

Rassurez vous, ce n'est pas parce qu'il n'est plus possible de traiter que vous ne pourrez pas vous débarrasser de vos parasites, il existe des recettes qui ont fait leurs preuves.

Même si ce sont des solutions naturelles, ces traitements doivent être réfléchis et utilisés en dernier recours. Avant de dégainer son pulvérisateur, il faut impérativement se poser les bonnes questions. Est-ce que l'attaque est véritablement dangereuse pour les plantes ? Est-ce qu'elle peut mettre à mal la santé des plantes ? Si la réponse est oui aux deux questions, vous pourrez alors envisager un traitement naturel.



Nom : Piéride du Chou

Aspect : La piéride adulte (papillon) est inoffensive, sa larve en revanche est nocive

Période propice au développement : De fin juillet à Octobre

Plantes vulnérables : Elles s'attaquent à de nombreuses espèces de choux : chou fleur, chou rave, chou pommé, chou frisé, chou de Bruxelles, brocoli....

Symptômes et dégâts apparents : Au début de leur développement, les chenilles font quelques trous dans les feuilles les plus externes, puis elles gagnent le cœur et leurs excréments s'accumulent entre les feuilles ce qui souille le chou et peut le rendre impropre à la consommation.

1. La Recette

Faites macérer 1kg de tiges et feuilles de tomates (récupérez les gourmands) dans 10 litres d'eau. Le purin sera utilisable au bout de 10 jours.

2. Application

Une pulvérisation sur le feuillage

3. A renouveler

Tous les 15 jours

4. Remarques

L'application du purin de feuilles de tomates a une action préventive. Il faut donc s'y prendre assez tôt. Toutes les plantes qui ont un feuillage odorant (Tanaisie, menthe, cotronelle, etc.) repoussent en général les piérides du chou. N'hésitez pas à en planter près de vos choux